

Recueil des urines pour ECBU

De préférence le matin au lever. A défaut, au moins deux heures après la précédente miction. Si urgence, effectuer dès que possible.

Recueil par voie naturelle (miction)	Recueil sur sonde à demeure
<ul style="list-style-type: none"> - Se laver les mains - Faire une toilette intime à l'aide de la lingette fournie - Ouvrir le flacon de recueil - Eliminer le premier jet d'urines dans les toilettes - Recueillir le second jet dans le flacon puis le refermer 	<ul style="list-style-type: none"> - ne pas déconnecter la sonde, utiliser systématiquement le site de ponction - clamber le tuyau du sac collecteur pendant 15 à 30 minutes - désinfecter le site de ponction avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique - prélever avec seringue et aiguille stériles un échantillon d'urine et transvaser dans un flacon de recueil stérile - déclamber le tuyau du sac collecteur
Identifier le flacon avec votre nom et prénom Apporter le flacon au laboratoire dès que possible - flacon sans conservateur : max 2h à température ambiante ou 12 h au frigo - flacon avec conservateur : max 24h à température ambiante (utiliser le sachet fourni, joindre cette fiche de renseignements complétée ci-dessous)	

Recueil des urines

- miction (2ème jet) sonde à demeure Urinocol
 sondage aller-retour autre

Renseignements cliniques

- Avez-vous . des envies plus fréquentes d'uriner ? Oui Non
- actuellement : . des brûlures lorsque vous urinez ? Oui Non
- . de la fièvre ? Oui Non
- . mal en bas du dos ? Oui Non
- . précisez si autres symptômes.....
- Avez-vous pris des antibiotiques depuis moins d'une semaine ? Oui Non
- Si oui, lesquels ?.....
- Il s'agit d'un contrôle avant intervention chirurgicale/autre ? Oui Non
- Madame, êtes-vous enceinte ? Oui Non

NOM / Prénom

Date et heure de recueil